Stappenplan uitbraak droes

Droes is de meest voorkomende bacteriële luchtweginfectie bij paarden en wordt veroorzaakt door de Streptococcus Equi bacterie. Droes is zeer besmettelijk en kan door zowel direct contact (neus-neus of neus-mond) als indirect contact (waterbak, tuig, handen, gereedschap) overgebracht worden. Bij een paard met verdenking van droes kunnen onderstaande stappen ondernomen worden:

Stappenplan

1. Isoleer het paard/de paarden die verdacht zijn van droes. Isolatie-afstand is minimaal 10-15 meter. Zorg dat alleen aangewezen personeel bij deze paarden kan komen.

2. Bel de dierenarts. Houd de paarden geïsoleerd tot het tegendeel bewezen is. Wanneer de besmetting bevestigd is maak je samen met je dierenarts een plan van aanpak om de ziekte te bestrijden en verdere besmetting te voorkomen.

3. Breng eerst het personeel op de hoogte en zorg ervoor dat iedereen weet wat het plan is. Vervolgens kan er verder gecommuniceerd worden naar de stalklanten (*mail, app, mededelingenbord, etc.*) en eventueel omliggende bedrijven (*bellen, langsgaan*).

4. Pas het stalmanagement aan om verdere besmetting te voorkomen:

   - Haal desinfecterende middelen (*handgel-zeep*) om op diverse plekken rondom de stal te zetten voor bezoekers en personeelsleden.

   - Hang informatiebladen op voor bezoekers (*handen wassen/schone kleding aan/ niet met verschillende paarden knuffelen/geen andere paardenbedrijven bezoeken*).

   - Zorg dat het personeel dat de geïsoleerde en zieke paarden verzorgt wegwerphandschoenen en plastic schorten gebruikt en de mogelijkheid heeft om zich ter plekke om te kleden en te desinfecteren.

   - Het gereedschap (*mestvork/emmers/bezems/kruiwagens*) wat wordt gebruikt bij de geïsoleerde paarden moet daar blijven om indirecte besmetting te voorkomen.

   - Stop onmiddellijk met het verplaatsen/verhuizen van paarden van en naar het bedrijf (*dit geldt nog voor een periode van 4-6 weken na de laatste besmetting*).

   - Zorg ervoor dat pensionklanten, lesklanten en bezoek van buitenaf niet in de buurt kunnen komen van de met droes besmette paarden.

5. Loop alle paarden op stal na op verdenking van droes en maak 3 groepen:

   - **Rood: Ziek en besmettelijk – vertonen droes verschijnselen/droes is vastgesteld.** Deze paarden moeten direct geïsoleerd worden. Paarden mogen uit de isolatie als ze droes vrij verklaard zijn. Dit kan als er een luchtzakspoeling plaatsgevonden heeft en deze negatief was. Reinig en desinfecteer (Halamid) bij deze paarden de drinkbakken en plaatsen met snot (wanden/boxdeur).

   - **Oranje: Hoog risico – zijn in contact geweest met besmette paarden.** Blijf deze paarden goed monitoren. Temperatuur deze paarden 2x per dag. Bij een

temperatuur boven de 38,5 of op vertoon van droesverschijnselen moet het paard verplaatst worden naar de rode groep.

- **Groen: Matig risico – heeft geen direct contact gehad met paarden uit rode of oranje groep, maar kunnen wel indirect (waterbak/tuig/handen/gereedschap) besmet zijn.** Deze paarden zijn niet direct in contact geweest met de paarden uit de rode of oranje groep en lopen daardoor minder risico. Blijf deze groep wel goed monitoren en bij het signaleren van droes verschijnselen moet het paard verplaatst worden naar de rode groep.

Als het mogelijk is zorg er dan voor dat iedere groep zijn eigen stalgereedschap heeft en dat personeel ingedeeld is op een groep. Temperatuur (in ieder geval de groene groep) 2x per dag. Bij koorts moet deze aan de rode groep worden toegevoegd.

Zie het Excel werk-document voor diverse invulschema.

6. Paarden kunnen 4 tot 6 weken na het stoppen van de neus/oog/abces uitvloeiing besmettelijk blijven voor andere paarden. Houd het paard dus geïsoleerd totdat de dierarts aangeeft dat het paard weer uit isolatie mag.

7. Wanneer alle paarden volledig hersteld zijn van droes is het van belang dat de stallen goed gedesinfecteerd worden. Denk hierbij aan de volgende punten:

   - □ Verwijder alle bodembedekking en voer die zo snel mogelijk af.
   - □ Reinig de bodem en muren door grondig te boenen met water en zeep en laat GOED drogen (hogedruk word niet geadviseerd i.v.m. verspreiding van bacterie middels rondvliegende waterdruppels).
   - □ Desinfecteer vervolgens alles met Halamid en spoel dit goed af.
   - □ Desinfecteer al het stalgereedschap (*kruiwagens/bezems/mestvorm/emmers/etc.*).
   - □ Desinfecteer alle kleding en schoeisel.
   - □ Desinfecteer poestspullen/halsters/harnachement/dekjes/dekens.